

## FERTIPHOS COMBI KLT

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

**Producto:** FERTIPHOS COMBI KLT

**Formulador:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor:** Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C


**Clase:** Fertilizante foliar

### II. INGREDIENTES ACTIVOS

Magnesio (MgO)	30 g/L
Manganeso (Mn)	10 g/L
Hierro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10 g/L
Cobre (Cu)	10 g/L
Zinc (Zn)	10 g/L
Boro (B)	1 g/L
Cobalto (Co)	0.5 g/L
Molibdeno (Mo)	0.2 g/L
Auxiliares de formulación	c.s.p 1 L

### III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

- Estado Físico Líquido
- Color Verde
- Olor Característico
- Densidad  $1.15 \pm 0.05$
- pH  $2.0 \pm 0.5$
- Inflamabilidad No inflamable
- Explosividad No explosivo
- Corrosividad No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 3 años



**IV. FORMULACION**

Concentrado Soluble - SL

**V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

FERTIPHOS COMBI-KLT es un concentrado soluble de microelementos quelatizados para una rápida y fácil asimilación por las plantas.

**VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION**

Cada microelemento de FERTIPHOS COMBI-KLT tiene funciones específicas en el desarrollo y crecimiento de las plantas y todos están relacionados entre sí, la ausencia de cualquiera de ellos altera la función de otros.

FERTIPHOS COMBI-KLT corrige la carencia de microelementos indispensables para la formación de clorofila, proteínas y ayuda a la movilización y asimilación de otros nutrientes.

**VII. RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	250 a 300 ml	1° Antes de la floración 2° Después de formadas las bellotas.
Pimiento, Tomate, Ají, Páprika	250 a 300 ml	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo.
Frijol, Soya, Haba, Vainita - Arveja	250 a 300 ml	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de las vainas.
Zapallo, Sandilla, Melón, Pepinillo	250 a 300 ml	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de los frutos.
Frutales	100 a 200 ml	1° Antes de la 1ra. floración 2° Inmediato después del cuajo de los frutos.
Vid	250 ml	1° Sola aplicación foliar. Después del cuajo de los frutos del racimo.
café	100 a 200 ml	1° Antes de la 1ra. floración 2° Inmediato después del cuajo del fruto (cerezo)
Alcachofa	250 a 300 ml	- En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra. - Después del trasplante: A los 60 y 90 días del trasplante.
Espárrago	250 a 300 ml	- En Almacigo: 1° A los 60 días de siembra 2° A los 30 días después de la primera. - Después del trasplante y cada cosecha: 1° Antes del inicio de la floración 2° A los 30 a 35 días de la 1ra. aplicación.
Marigold, Flores	250 a 300 ml	- En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra. - Después del trasplante: A los 20 y 30 días del trasplante.
Arroz	250 a 300 ml	Aplicar antes de la floración 1-2 veces cada 10 días

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

FERTIPHOS COMBI-KLT se recomienda aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

## IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **FERTIPHOS COMBI KLT** / 30.10.2024

