

FULVIKO® (ACIDO FULVICO-COMPLEJANTE DE NUTRIENTES)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Producto: FULVIKO®
Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C
Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C
Clase: Enmienda Humica líquido

II. COMPOSICIÓN

<u>Ingredientes activos</u>	<u>p/v</u>
Ácido Fúlvico derivado de leonardita.....	25 %
Auxiliares de formulación.....	c.s.p. 1L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico	Líquido
Color	Negro
Olor	Característico.
Densidad	1.12 g/ml
pH	5.9
Solubilidad en agua	Miscible
Inflamabilidad	No inflamable
Explosividad	No explosivo
Corrosividad	No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 2 años

IV. FORMULACION

Concentrado Soluble - SL

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FULVIKO® es una enmienda líquida con alto contenido de ácido fulvico derivado de

Leonardita con acción complejante, que puede ser aplicado al área foliar o la zona radicular conjuntamente con los nutrientes de aplicación foliar, o los fertilizantes de uso convencional usados en fertirriego para favorecer su asimilación. Los ácidos fulvicos contenidos en **FULVIKO®** mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

FULVIKO® es un complejante que interactúa con los nutrientes para una mejor absorción en el área foliar y del sistema radicular.

FULVIKO® desbloquea los elementos minerales retenidos en el suelo haciéndolo disponible para el cultivo.

FULVIKO® aumenta la permeabilidad celular facilitando la absorción de los nutrientes.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

La dosis recomendada de **FULVIKO®** es de 5 a 10 litros por hectárea/aplicación vía sistema riego, hasta completar los 40 a 60 litros/ha por campaña. Y la dosis recomendada de **FULVIKO®** como complejante para la aplicación de nutrientes vía foliar es de 2 litros por hectárea/aplicación, pudiéndose aplicar en diferentes fases fenológicas del cultivo.

FULVIKO® puede ser aplicado en diversos cultivos como los industriales, frutales (cítricos, palto, mango, olivo, vid, manzano, cacao, melocoton, arándano, granado, banano, etc), hortalizas (papa, ají escabeche, pimentón, tomate, cebolla, ajo, etc), brócoli, alcachofa, ornamentales, anuales y perennes.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

FULVIKO® puede ser aplicado en diferentes fases fenológicas durante el desarrollo de los cultivos con frecuencias de 7 a días entre aplicación.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por

ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **FULVIKO®** / 25.02.2025

