

PLENTYPHOS – P Nutriente Foliar

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Producto: PLENTYPHOS – P

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C

Clase: Fertilizante Foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Nitrogeno Total	(N)	10.0%
Fósforo disponible	(P ₂ O ₅)	45.0%
Potasio soluble	(K ₂ O)	10.0%
Magnesio	(MgO)	400 ppm
Hierro	(Fe ₂ O ₃)	100 ppm
Zinc	(Zn)	100 ppm
Manganeso	(Mn)	100 ppm
Cobre	(Cu)	100 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido/Polvo
- Color: Amarillo
- Olor: Inodoro
- Densidad: No aplica
- pH: 4.5 ± 1.0
- Solubilidad en agua: 100 % soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años

IV. FORMULACION

Polvo Mojable - WP

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLENTYPHOS-P, contiene un alto porcentaje de Fósforo, en combinación equilibrada con Nitrógeno, Potasio, Microelementos Quelatizados de Mg, Zn, Fe, Cu, Mn y Precusores Hormonales.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

PLENTIPHOS-P es un fertilizante foliar solido, que por su alto contenido de Fósforo (P2O5), en combinación equilibrada con los demás elementos de su composición y precursores hormonales estimula la formación de raíces al inicio de los cultivos, y en su fase final acelera la maduración y crecimiento mejorando calidad y tamaño, acelera la formación de brotes, recupera plantas con problemas elevando sus rendimientos.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (Kg/200 L)	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Papa	1 a 2	Dos aplicaciones foliares la primera a los 20 a 25 días de siembra y la segunda a los 20 días después de la anterior aplicación.
Arroz	1	1 ^{ra} aplicación después del trasplante para el macollamiento.
Alcachofa Maíz Choclo Quinoa Maca	1	1 ^{ra} Entre los 10 a 15 días de la siembra o trasplante en mezcla con ROOT HOR. 2 ^{da} Al inicio de floración en mezcla con PRECURSOR.
Frijol Vainita Aveja Pallar Garbanzo	1	1 ^{ra} A los 10 a 15 días de la siembra en mezcla con ROOT-HOR 2 ^{da} Al inicio de floración en mezcla con PRECURSOR.
Lechuga Coliflor Brocoli Col Apio Poro Nabo Ajo Cebolla	1	1 ^{ra} A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante en mezcla con ROOT HOR. 2 ^{da} A los 25 días en mezcla con FITAMINAS.
Papaya Melocoton Café Cacao	1 a 2	1 ^{ra} Durante la etapa de crecimiento vegetativo del cultivo. 2 ^{da} Al inicio de la floración conjuntamente con el PRECURSOR

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

PLENTYPHOS-P se recomienda aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / PLENTYPHOS-P 10+45+10+ME / 15.09.2024

