

**SANIX****I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA****Producto:** SANIX**No Registro:** PBUA N°058 - SENASA**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** CICATRIZANTE HORMONAL AGRÍCOLA**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Betaina                    | 28.00 g/L  |
| Sulfato de Zinc            | 7.00 g/L   |
| Propanotriol               | 99.00 g/L  |
| Acido Alfa Naftalenacetico | 0.80 g/L   |
| Solventes y Coadyuvantes   | 864.20 g/L |

**III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS**

- Estado Físico: Pasta
- Color: Celeste
- Olor: Característico
- pH:  $8.0 \pm 0.1$
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

**IV. FORMULACION**

Pasta - PA

**V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

SANIX es una pasta cicatrizante que, por la naturaleza de sus componentes, sella cortes de poda, injertos o heridas, formando una barrera física contra patógenos y favoreciendo la regeneración de tejidos mediante acción osmoprotectora, aporte de micronutrientes y estimulación de la formación de callo.

### VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

SANIX, formulado en pasta, actúa como cicatrizante y sellador de uso agrícola. Aplicado directamente sobre cortes de poda, injertos o heridas, forma una barrera protectora que impide o reduce el ingreso de patógenos (hongos y bacterias) al tejido vegetal.

### VII. USOS REGISTRADOS

SANIX es una pasta protectora utilizada para prevenir el ingreso de patógenos en cortes de poda y heridas de injertos, en árboles frutales como la vid, palto, arándanos, cítricos, entre otros.

### VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Para obtener resultados óptimos, se recomienda aplicar la pasta fitocicatrizante SANIX de forma directa sobre la herida ocasionada por cortes de poda o injertos, utilizando una brocha. Se recomienda no realizar riegos antes o después de la aplicación. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando que en frutales corresponde a una campaña al año, una vez efectuada la poda en verano o invierno.

### IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría IV – Precaución

### X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **SANIX** / 15-08-2025