

SANIX**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA****Producto:** SANIX**No Registro:** PBUA N°058 - SENASA**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** CICATRIZANTE HORMONAL AGRÍCOLA**Fecha de actualización:** 23/02/2026**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Betaina	28.00 g/L
Sulfato de Zinc	7.00 g/L
Propanotriol	99.00 g/L
Acido Alfa Naftalenacético	0.80 g/L
Solventes y Coadyuvantes	864.20 g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Líquido pastoso
- Color: Celeste
- Olor: Característico
- Densidad: 1.47 ± 0.05 g/ml
- pH: 8.0 ± 0.1
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Pasta - PA

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SANIX es una pasta cicatrizante que, por la naturaleza de sus componentes, sella cortes de poda, injertos o heridas, formando una barrera física contra patógenos y

favoreciendo la regeneración de tejidos mediante acción osmoprotectora, aporte de micronutrientes y estimulación de la formación de callo.

Condición de Almacenamiento: Conservar bajo techo en un ambiente con temperatura controlada entre 20°C y 25°C.

Envase: Mantener el envase sellado herméticamente para garantizar la integridad del producto.

Advertencia: El contacto con el aire causa el secado/endurecimiento irreversible. Por lo tanto, el producto es de uso exclusivo inmediato.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

SANIX, formulado en pasta, actúa como cicatrizante y sellador de uso agrícola. Aplicado directamente sobre cortes de poda, injertos o heridas, forma una barrera protectora que impide o reduce el ingreso de patógenos (hongos y bacterias) al tejido vegetal.

VII. USOS REGISTRADOS


SANIX es una pasta protectora utilizada para prevenir el ingreso de patógenos en cortes de poda y heridas de injertos, en árboles frutales como la vid, palto, arándanos, cítricos, entre otros.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Para obtener resultados óptimos, se recomienda aplicar la pasta Fito cicatrizante SANIX de forma directa sobre la herida ocasionada por cortes de poda o injertos, utilizando una brocha. Se recomienda no realizar riegos antes o después de la aplicación. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando que en frutales corresponde a una campaña al año, una vez efectuada la poda en verano o invierno.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría IV – Precaución



X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

