

TRIMMEX 20 SP[®]**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA****Producto:** TRIMMEX 20 SP**No Registro:** PQUA N° 437 -SENASA**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** INSECTICIDA AGRICOLA**Fecha de actualización:** 21/11/2025**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Acetamiprid 200 g/Kg

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido
- Color: Azul
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 8.0 ± 2.0 (1% en solución)
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Polvo Soluble – SP

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TRIMMEX 20 SP es un insecticida que presenta una actividad translaminar y sistémica actuando por contacto e ingestión, es empleado en diversos cultivos para el control de diversas plagas.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Mecanismo de acción:

TRIMMEX 20 SP es un insecticida neonicotinoide de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica actuando por contacto e ingestión.

Modo de acción

TRIMMEX 20 SP, es empleado en diversos cultivos para el control de diversas plagas, actuando como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.

VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | g/cil | g/ha | | |
| Arándano | Thrips amarillo | <i>Scirtothrips dorsalis</i> | 100 | - | 1 | 2 |
| Algodón | Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | 150 - 200 | 300 - 400 | 7 | 0.02 |
| Cebolla | Thrips | <i>Thrips tabaci</i> | 100 - 200 | 200 - 400 | 7 | 0.02 |
| Mandarina | Queresa redonda | <i>Selenaspidus articulatus</i> | 200 | - | 14 | 1 |
| Vid | Thrips | <i>Thrips tabaci</i> | 100 | - | 3 | 0.5 |

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente peligroso – Cuidado

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes,

lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

