

14.5 cm x 29.2 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CARACTERISTICAS

PROTENZIM es una formulación de bioestimulante de última generación que posee un marcado efecto antiestresante sobre los cultivos tratados. Protege y ayuda a los cultivos a superar el estrés abiótico y biótico debido a la combinación de sus principales ingredientes activos como la Glicina Betaína, que actúa como osmoprotector a nivel celular en la planta, la L-Prolina, que actúa como un agente osmótico protegiendo a la planta de la deshidratación; y el AATC, que estimula el metabolismo de autodefensa frente al estrés de las plantas.

BENEFICIOS

- **PROTENZIM** ejerce una acción estimulante y antiestresante en todas las fases de crecimiento del cultivo: germinación, trasplante, desarrollo, floración, cuajado y crecimiento del fruto.
- **PROTENZIM** es un antiestresante fisiológico de la planta que contiene Glicina Betaína, L-Prolina, AATC, y ácido fólico, enriquecido con un alto contenido aminoácidos y vitamina B1 que estimulan la actividad fisiológica y transporte de reservas en las plantas.
- **PROTENZIM** permite salir y soportar mejor las condiciones de estrés que sufre el cultivo, debido a ellos puede ser utilizado en periodos de gran gasto de energía (activo crecimiento) y estrés (altas temperaturas, deficiencia de agua y ataque de plagas, virosis, heladas, fitotoxicidad, granizo, asfixia radicular, etc).

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta etiqueta.

“AGITAR ANTES DE USAR”

PROTENZIM

(Glicina Betaína + L-Prolina)

BIOESTIMULANTE - ANTIESTRESANTE

COMPOSICIÓN

Glicina Betaína.....100.00 g/L
L-Prolina.....100.00 g/L
Otros aminoácidos libres.....200.00 g/L min.
AATC (Ácido N-acetyl-thiazolidin-4 carboxílico).....25.00 g/L
Ácido Fólico.....1.00 g/L
Vitamina B1.....1.00 g/L
Nitrógeno (N) orgánico.....50.00 g/L min.
Auxiliares de formulación.....c.s.p. 1L

Formulado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

RECOMENDACIONES DE USO

PROTENZIM se recomienda aplicar por aspersión al área foliar o vía riego para ser absorbido por las raíces del cultivo, para favorecer el crecimiento, desarrollo, floración y fructificación de los cultivos, pudiéndose aplicar en los momentos más cruciales de desarrollo vegetativo, floración, cuajado y cuando el cultivo está siendo sometido a situación de estrés.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Espárrago	500 ml/ 200 L 1 – 1.5 L/ ha Aplicación foliar	1. Desarrollo del primer brotamiento. 2. Desarrollo del segundo brotamiento.
Arroz		1. Al macollamiento. 2. En punto algodón.
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía, pepinillo, etc.		1. Durante la etapa del desarrollo vegetativo. 2. Al inicio de floración.
Hortalizas: Pepino dulce, ajo, coliflor, alcachofa, brócoli, cebolla, col, espinaca, rocoto, tomate, ají, páprika, pimiento, fresa y otros.		1. Aplicar una semana después del trasplante. 2. En pleno crecimiento del cultivo.
Leguminosas: Arveja, frijol, pallar, garbanzo, vainita, habas, holantao.		1. Durante el desarrollo vegetativo. 2. Inicio de floración.
Tubérculos y raíces: Camote, papa, yuca y otros.	1 – 2 L/ha Aplicación foliar 3 – 4 L/ha Aplicación vía riego	1. Durante la primera fase del crecimiento del cultivo. 2. Al inicio de la floración.
Frutales: Cítricos, palto, arándano, uva, granada, maracuyá, pera, melocotón, olivo, manzano, pitahaya, papaya, higo, granadilla, limón, lúcumá, mango, caqui, plátano y demás frutales.		1. Durante la etapa de brotamiento. 2. Al inicio de la floración. 3. En la etapa del cuajado de frutos.

1.3 cm

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C