

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimento y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No rehúse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Al contacto con la piel lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CAISAC: (01) 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Fithor®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN

Giberelinas 41.08 g/L
Auxinas 40.91 g/L
Extracto de Algas 918.01 g/L

Reg. PBUA N° 151 – SENASA

Titular de Registro, Formulador
y distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITHOR es un regulador de crecimiento de planta que favorece la multiplicación en grosor y longitud. FITHOR provoca el brotamiento de yemas de las semillas de papa.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Usa FITHOR 100 ml en 200 L de agua para remojar semillas de papa durante 5 minutos. Remojando 2,000 kg de semillas para 1 hectárea. La semilla tratada se oreada o secará bajo sombra. Una vez seco esparcir en tendales techados, luego abrigharlos con paja y esteras (no use mantas de plástico).

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Dosis			P.C. (días)	LMR (ppm)
	Aplicaciones foliares		Para remojar semillas/200 L		
	L/ha	L/200 L			
Papa	-	-	100 ml	N.A.	N.A.
Cebolla	0.5 L	-	-	N.A.	N.A.
Vid	-	0.05 L	-	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso del producto al inicio de cada campaña y/o en aquellos momentos en que se requiera que la planta estimule la producción de nuevas raíces.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FITHOR es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FITHOR no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



BANDA VERDE PANTONE 347 C

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C

Fondo Fithor
Pantone 3005C al 70%