

14.5 cm x 29.2 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.**

GENERALIDADES

FOLTEINA XL es un bioestimulante que puede ser aplicado vía foliar en todos los cultivos para incrementar la producción en calidad y en cantidad.

La folcisteína contenida en **FOLTEINA XL** cumple una función importante activando las enzimas que catalizan el metabolismo de la planta, así como una función inductora del mecanismo de autodefensa de la planta contra el estrés.

El ácido fólico contenido en **FOLTEINA XL** cumple una función esencial en los mecanismos de la reproducción celular.

FOLTEINA XL contribuye a un mejor desarrollo de la planta y le permite soportar mejor las condiciones adversas y expresar su potencial de producción.

FORMA DE APLICACIÓN

FOLTEINA XL deberá aplicarse diluido en agua a las dosis recomendadas y empleando el caudal necesario para una completa y homogénea cobertura del cultivo.

CONSERVACIÓN

Este producto debe conservarse en sus envases y embalajes originales, en locales secos y ventilados al abrigo de la luz y de las condiciones climáticas extremas (no menos de 5°C y no más de 30°C).

COMPATIBILIDAD

FOLTEINA XL es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas, excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina a base de cobre y otros.

“AGITAR ANTES DE USAR”

FOLTEINA XL
(Folcisteína)

Bioestimulante agrícola

COMPOSICIÓN:

Folcisteína 5%
Glicina Betaina 2.5%
Ácido Fólico 1.0 g/L
Auxiliares de formulación c.s.p. 1L

Formulado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis	
		Cil.	ha.
Espárrago	1. Desarrollo del primer brotamiento. 2. Desarrollo del segundo brotamiento.	100 ml a 200 ml	0.3L a 0.5 L
Arroz	1. Al macollamiento. 2. En punto algodón.	100 ml a 200 ml	0.2L
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía, pepinillo, etc.	1. Durante la etapa del desarrollo vegetativo. 2. Al inicio de floración.	100 ml a 200 ml	0.2 a 0.4L
Hortalizas: Pepino dulce, coliflor, ajo, alcachofa, brócoli, cebolla, col, espinaca, rocoto, tomate, zapallo, ají, páprika, pimiento y otros.	1. Aplicar una semana después del trasplante. 2. En pleno crecimiento del cultivo.	100 ml a 200 ml	0.2L a 0.4L
Leguminosas: arveja, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita.	1. Durante el desarrollo vegetativo. 2. Inicio de floración.	100 ml a 200 ml	0.2L a 0.4L
Tubérculos y raíces: Camote, papa, yuca y otros.	1. Durante la primera fase del crecimiento del cultivo. 2. Al inicio de la floración.	100 ml a 200 ml	0.2L a 0.4L
Frutales: Cítricos, palto, arándano, uva, granada, maracuyá, melocotón, pera, manzano, pitahaya, olivo, papaya, higo, granadilla, limón, lúcuma, mango, caqui, plátano y demás frutales.	1. Durante la etapa de brotamiento. 2. Antes de la floración. 3. En la etapa del cuajado de frutos.	100 ml a 200 ml	0.5L a 1.5L

NOTA AL COMPRADOR: La empresa formuladora garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones dadas.

1.3 cm

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C