

**KURADOR****I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA****Producto:** KURADOR**No Registro:** PQUA N° 1481 -SENASA**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** FUNGICIDA AGRICOLA**Fecha de actualización:** 21/11/2025**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Carbendazim 250 g/L + Tebuconazole 125 g/L

**III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS**


- Estado Físico: Líquido
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- Densidad:  $1.10 \pm 0.1$  g/ml
- pH:  $6.5 \pm 1.5$
- Solubilidad en agua: No aplica
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

**IV. FORMULACION**

Suspensión Concentrada – SC

**V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

KURADOR es un fungicida sistémico, de rápida absorción de acción preventiva y curativa.



## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

### MECANISMO DE ACCIÓN:

**Tebuconazole:** Inhibe la síntesis del ergosterol en los hongos patógenos susceptibles.

**Carbendazim:** Impide la formación del uso acromático en la división celular.

### MODO DE ACCIÓN:

**Tebuconazole:** Fungicida de acción sistemática y efecto preventivo-curativo que inhibe la síntesis del ergosterol en los hongos susceptibles.

**Carbendazim:** Fungicida de acción sistemática y efecto preventivo-curativo que inhibe la división celular de los hongos susceptibles.

## VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO | PLAGAS           |                           | DOSIS   |         | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|---------|------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|----------------|
|         | Nombre Común     | Nombre científico         | L/200 L | L/ha    |               |                |
| Arroz   | "Pyricularia"    | <i>Pyricularia oryzae</i> | 0.5     | -       | 35            | 0.01*<br>1.0** |
| Cebolla | "Marchitez"      | <i>Fusarium oxysporum</i> | -       | 1.5     | 14            | 0.1*<br>0.1**  |
| Papa    | "Tizón temprano" | <i>Alternaria solani</i>  | 0.5     | -       | 14            | 0.1*<br>0.02** |
| Páprika | "Botrytis"       | <i>Botrytis cinerea</i>   | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 7             | 0.1*<br>0.5**  |
| ajo     | "Marchitez"      | <i>Fusarium oxysporum</i> | -       | 1.0-1.5 | 14            | 0,1*<br>0,1**  |


\*Carbendazim, \*\* Tebuconazole

P.C.: Período de Carencia

LMR: Límite de Máximo de Residuos

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar KURADOR dos veces por campaña como máximo considerando una campaña por año, la frecuencia entre aplicaciones dependerá de la presencia de la enfermedad. Para el cultivo de ajo, realizar una aplicación por campaña, considerando una campaña por año. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de



los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda usar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción.

### **IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA**

Categoría II – Moderadamente peligroso – Dañino

### **X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

