

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA**

Producto: SULFLIQ AZUFRE IONIZADO
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase : Nutriente foliar de uso agrícola

Fecha de actualización: 03/11/2025

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Azufre (SO₃).....88.00 %
Nitrógeno (N).....12.00 %

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Transparente
Olor: Característico
pH (10%): 7.5 ± 1.0
Densidad a 20 °C: 1.330 ± 0.1 g/mL
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento: Estable 2 años

IV. FORMULACIÓN

Concentrado soluble - SL

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **SULFLIQ** es un novedoso nutriente foliar que aporta nitrógeno y azufre (S) en forma ionizada. este último es un elemento clave en la síntesis de enzimas y aminoácidos indispensables para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- Además, **SULFLIQ** presenta una acción nutrífita sanitaria, actuando como coadyuvante en el control de algunas plagas y enfermedades, tales como: ácaros blancos, arañas rojas, prodiplosis y oídium en diferentes cultivos

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- SULFLIQ** es un producto de aplicación foliar, de aspecto transparente, que es absorbido eficientemente por las plantas, corrigiendo deficiencias de azufre (S) en diversos cultivos. El azufre participa en la formación de aminoácidos, vitaminas y enzimas esenciales para el metabolismo celular vegetal. A diferencia de otras formulaciones, **SULFLIQ** no deja sedimentos ni produce manchas en los órganos de la planta.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Espárrago	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Al inicio del brotamiento, aplicar sólo o en mezcla con pesticidas.
Páprika, pimiento, aji, tomate	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el inicio de floración.
Papa	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Desde el desarrollo vegetativo hasta inicio de floración.
Fresa	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Después de tres semanas del trasplante.
Alcachofa	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Desde los 30 días del trasplante.
Zapallo, melón, sandía	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el inicio de maduración del fruto.
Vid, arándano	0.5 – 1.0	2.0 – 3.0	Iniciar las aplicaciones desde el brotamiento hasta el inicio del envero.
Frejol, arveja, vainita	0.5 – 1.0	1.5 – 2.0	Durante el desarrollo vegetativo hasta el llenado del grano.
Durazno, manzano, cítricos palto	0.5 – 1.0	1.5 – 3.0	Desde el brotamiento hasta el desarrollo del fruto.
Mango	0.5 – 1.0	2.0 – 5.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el cuajado de frutos.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- SULFLIQ** es un producto que puede ser usado preferentemente en estados tempranos de los cultivos para corregir deficiencias de (S) y/o como un NUTRIFITOSANITARIO toda vez que el aporte de Azufre del producto evita que el oídio ataque tempranamente a los cultivos tratados, mejorando de esta manera la fisiología normal de la planta, restableciendo su vigor, lo que incide en la mejora de la calidad y producción final de los productos cosechados.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.