

29.2 cm

Frutyflor-PK®
Fertilizante Potásico

El alto contenido de potasio y fósforo de **Frutyflor-PK** induce y estimula la multiplicación de flores por brotamiento rápido de las yemas, asegurando el cuajado y desarrollo de los frutos.

Por su elevado contenido de fósforo y potasio en conjunción con los precursores hormonales, ayudan a las plantas en la formación de frutos.

Frutyflor-PK es un excelente aliado del agricultor para producir más y mejores cosechas.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar seco y en su envase original.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No es tóxico a los humanos y animales.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El fabricante garantiza que el contenido, concuerda con lo indicado y es apto para su uso siguiendo las indicaciones impartidas.

• *Agitar antes de usar el producto* •

Frutyflor-PK®
1 - 26 - 45

COMPOSICIÓN (P/V)

Nitrógeno Total (N).....	1.0 %
Fósforo Disponible (P ₂ O ₅).....	26.0 %
Potasio Soluble (K ₂ O).....	45.0 %
Magnesio (MgO).....	400 ppm
Hierro (Fe ₂ O ₃).....	100 ppm
Zinc (Zn).....	100 ppm
Manganeso (Mn).....	100 ppm
Cobre (Cu).....	100 ppm
Boro (B).....	85 ppm

Formulado por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

Distribuido por:
Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

CONTENIDO NETO : 1 LITRO

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
© Marca registrada

Frutyflor-PK®
Fertilizante Potásico

CULTIVO	DOSIS		EPOCA Y N° DE APLICACIONES
	L/ha	L/200L	
• Papa	2	1	1° Al inicio de floración antes del aporque, en mezcla con Big-Hor. 2° A los 25 días de la anterior aplicación para mejor tuberización en mezcla con Nitrosol-N.
• Algodón	2	1	1° Al inicio de la formación del botón floral, en mezcla con Big-Hor. 2° A la formación de bellotitas en mezcla con Big-Hor.
• Tomate • Aji • Pimiento • Páprika • Alcachofa • Espárrago	2	1	1° Al inicio de la floración para inducir mayor número de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera, una vez cuajado los frutos. En ambas aplicaciones con Big - Hor., para evitar caída de flores y frutos. Un mes antes de la cosecha.
• Frijol • Vainita • Arveja • Pallar • Garbanzo	2	1	1° A la floración para inducir a la multiplicación de flores. 2° A los 15 a 20 días de la primera. En mezcla con Big-Hor.
• Zapallo • Sandía • Pepinillo • Zapallito Italiano	2	1	1° Al inicio de la floración para la multiplicación de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera. En ambos conviene en mezcla con Big-Hor, para evitar la caída de flores y frutos, respectivamente.
• Arroz • Apio • Poro • Nabo • Ajo • Col • Cebolla • Coliflor • Zanahoria	2	1	1° A los 25 a 30 días de siembra o trasplante. 2° De 20 a 25 días de la primera aplicación. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor.
Frutales: • Arándanos • Cítricos • Palto • Melocotón • Manzano • Vid • Peral • Mango	3-5	1	1° Al inicio de la floración. 2° Al cuajado de los frutos. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor para evitar caída de flores y frutos.
• Marigold • Rosas	2	1	1° Al inicio de la formación de flores, mezclada con Big-Hor. 2° Después de cada cosecha, para mejorar la floración siguiente.

14.5 cm

1.3 cm