

29.2 x 14.5 cm

Keltex[®]

BORO

BORO ASIMILABLE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Keltex Boro es un compuesto líquido concentrado de rápida absorción.

Keltex Boro cumple las siguientes funciones:

- Tiene acción directa en la polinización.
- Reduce el excesivo desarrollo vegetativo.
- Incrementa el contenido de azúcar en los órganos de reserva de la planta.
- Favorece el cuajado de flores y frutos.
- Evita la presencia de granos vanos en las leguminosas.
- Optimiza el uso de nitrógeno en la planta.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar fresco y en su envase original.
- No lo transporte y almacene con alimentos y animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No es tóxico a los humanos y animales.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El productor/vendedor garantiza que el producto concuerda con la descripción química indicada y es apto para su uso siguiendo las instrucciones. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan producirse a consecuencia del mal uso.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE

Keltex[®]

BORO

BORO ASIMILABLE

COMPOSICIÓN:

Boro (B_2O_3)..... 15%
Complejado con ácidos orgánicos
Extractos Vegetales 40%
Auxiliares de formulación..... c.s.p. 1L

Formulado por:

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

Distribuido por:

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Keltex[®]

BORO

BORO ASIMILABLE

El boro incrementa el rendimiento y mejora la calidad de las frutas, hortalizas y forrajes; está relacionado con la transferencia de azúcares en las plantas.

USO Y DOSIS

CULTIVO	En 200 L de agua	Época y número de aplicación
Hortalizas Páprika	1/4 a 1/2 L	1. Posterior al cuajado de frutos en hortalizas. 2. A las 3 a 4 semanas antes de la cosecha en hortalizas de hoja y raíz.
Brócoli Alcachofa	1/2 a 1 L	1. Antes de la formación de la inflorescencia. 2. Repetir en 1 ó 2 aplicaciones cada 15 días.
Espárrago	1/2 a 1 L	1. Luego del primer corte. 2. Repetir 3 ó 4 veces cada 15 a 20 días.
Cultivos Anuales	1/4 a 1/2 L	1. 4 a 5 semanas antes de la cosecha. 2. Repetir 2 ó 3 veces cada 15 a 20 días.
Frutales: Cítricos Palto, Mango Olivio, Vid, Manzano, Cacao, Melocotón, etc	1/2 a 1 L	Aplicaciones: a. Antes de la floración. b. Después del cuajado c. Durante el llenado de frutos 1 a 2 aplicaciones cada 20 días.

1.3 cm

Logo caisac
Pantone 711C

Logo caisac
Pantone 2945 C

Azul claro
Pantone 299 C

Azul oscuro
Pantone 301 C

Logo semillas
C2 M70 Y96 K0

Logo semillas
C100 M80 Y0 K0