

29.2 x 14.5 cm



FERTILIZANTE FOLIAR CON ALTO CONTENIDO DE CALCIO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Keltex Calcio-Boro**, es un producto único en su género por ser ácido.
- **Keltex Calcio-Boro**, evita la caída de flores y frutos, mediante la regulación del Etileno, que se produce por las altas temperaturas.
- **Keltex Calcio-Boro**, facilita el movimiento de azúcares y almidones a los órganos de reserva.
- **Keltex Calcio-Boro**, regula el exceso de nitrógeno en la planta evitando que esta se "envicie".

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte y almacene con alimentos y animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El productos/vendedor garantiza que el producto concuerda con la descripción química y es apto para su uso siguiendo las instrucciones. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan producirse a consecuencia del mal uso.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE



FERTILIZANTE FOLIAR CON EL BALANCE ADECUADO DE CALCIO - BORO

COMPOSICIÓN:

Calcio (CaO).....	10.0 %
Boro(B).....	1.0%
Ácidos Carboxílicos	6.0%
Magnesio (MgO)	600 ppm

Formulado por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444

Distribuido por:
Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada



Keltex Calcio-Boro, es un bionutriente, formulado con ácidos orgánicos y carboxílico activos diseñado para promover el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída excesiva.

Keltex Calcio-Boro, mejora la fortaleza y elasticidad de los tejidos en los órganos reproductivos, al favorecer la formación de pectatos de calcio en la lámina media de las paredes celulares.

Keltex Calcio-Boro, incentiva el desarrollo del tubo polínico para mejorar la fecundación de flores y obtener un máximo cuajado y uniformidad de frutos.

USO Y DOSIS

CULTIVO	En 200 L de agua	Época y N° de Aplicaciones
Arroz	0.5 - 1L	1° Punto de algodón. 2° Desarrollo de la espiga.
Espárrago	0.5 - 1L	1° Luego del primer corte: - Repetir 3-4 aplicaciones cada 15-20 días
Algodón, Pimiento, Tomate, Ají, Páprika	0.5 - 1L	1° Al inicio de la Floración. 2° Después de la formación de los frutos.
Papa	0.5 - 1L	1° A los 40 a 50 días de la siembra, o antes del aporque. 2° A los 30 días de la primera aplicación.
Alcachofa	0.5 - 1L	Para la inducción de capítulos.
Frijol, Pallar, vainita, Arveja, Haba, Garbanzo	0.5 - 1L	1° Al inicio de la floración. 2° Después del cuajado de las vainas.
Zapallo, Melón, pepinillo, Sandía	0.5 - 1L	1° Al inicio de la floración. 2° Después del cuajado de frutos.
Frutales: Vid, Palto, Cítricos, Mango, Cacao y café	0.5 - 1L	

MODO DE APLICACIÓN: aplicaciones foliares, puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Es recomendable aplicar desde las primeras etapas de la floración hasta el cuajado de frutos.

FITOTOXICIDAD: No existe problemas de fitotoxicidad cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.