

29.2 x 14.5 cm



CUAJADO DE FLORES Y AMARRE DE FRUTOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Keltex®CaBZn, es un nutriente foliar con efecto bioestimulante que maximiza el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída.
- Keltex®CaBZn, regula la producción de Etileno responsable de la maduración y envejecimiento prematuro de los frutos; hace menos perecible las cosechas.
- Keltex®CaBZn, es un producto único en su género por ser ácido.
- Keltex®CaBZn, es líquido y con Microelementos Quelatizados de rápida asimilación.
- Keltex®CaBZn, evita la caída de flores y frutos, mediante la regularización del Etileno, que se produce por las altas temperaturas.
- Keltex®CaBZn, fomenta la polinización y fertilización de las flores; activa el crecimiento inicial de los frutos de forma consistente, evitando su rajado.
- Keltex®CaBZn, facilita el movimiento de azúcares y almidones a los órganos de reserva.
- Keltex®CaBZn, regula el exceso de nitrógeno en la planta evitando que esta se "envicie".

PRECAUCIONES

Consérvese en lugar seco y en su envase original bien cerrado. No lo almacene ni transporte junto con alimentos ni animales. Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El fabricante/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse a consecuencia del uso, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE



CUAJADO DE FLORES Y AMARRE DE FRUTOS

Keltex®CaBZn, es un bionutriente, formulado con aminoácidos, ácidos orgánicos y carbohidratos activos diseñado para promover el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída excesiva. Keltex®CaBZn, mejora la fortaleza y elasticidad de los tejidos en los órganos reproductivos, al favorecer la formación de pectatos de calcio en la lámina media de las paredes celulares. Keltex®CaBZn, incentiva el desarrollo del tubo polínico para mejorar la fecundación de flores y obtener un máximo cuajado y uniformidad de frutos.

USO Y DOSIS

CULTIVO	En 200 L de agua	Época y N° de Aplicaciones
Espárrago	500 ml	1° Luego del primer corte: - Repetir 3-4 aplicaciones cada 15-20 días
Algodón, Pimiento, Tomate, Ají, Páprika	500 ml	1° Al inicio de la Floración. 2° Después de la formación de los frutos.
Papa	500 ml	1° A los 40 a 50 días de la siembra, o antes del aporque. 2° A los 30 días de la primera aplicación.
Alcachofa	500 ml	Para la inducción de capítulos.
Frijol, Pallar, vainita, Arveja, Haba, Garbanzo	500 ml	1° Al inicio de la floración. 2° Después del cuajado de las vainas.
Zapallo, Melón, pepinillo, Sandía	500 ml	1° Al inicio de la floración. 2° Después del cuajado de frutos.
Frutales	500 ml	

MODO DE APLICACIÓN: APLICACIONES FOLIARES, puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Es recomendable aplicar en las primeras etapas de cuajo de flores.

FITOTOXICIDAD: No existe problemas de fitotoxicidad cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.