

29.2 cm x 14.5 cm

KLOROFILA

Aumenta los pigmentos naturales de las plantas otorgando mayor color a sus cosechas

CARACTERÍSTICAS

KLOROFILA, es un compuesto de microelementos nítricos, quelatizados, altamente asimilables por las hojas de las plantas. KLOROFILA, por su alto contenido de magnesio, fierro, zinc, azufre y nitrógeno nítrico es un excelente anti clorosis: cambia rápidamente a verde oscuro intenso el amarillamiento de las hojas.

KLOROFILA, por su contenido en microelementos esenciales entra en la función fotosintética, que es el proceso químico más importante que realizan las hojas. Solo las hojas verdes, con abundante cloroplasto y la acción de la luz solar, absorben agua y anhídrido carbónico, fabricando azúcares.

KLOROFILA, por los microelementos nítricos que contiene, evita o corrige las deficiencias, que se presentan como amarillentos de las hojas, que produce estrés en la planta.

KLOROFILA, aumenta el color verde natural de las hojas por contener Magnesio nitrado y quelatizado, el magnesio está ligado a la formación de clorofila, que es el conductor más común de las enzimas asociadas con el metabolismo energético de las plantas.

KLOROFILA, actúa esencialmente en los tejidos meristemáticos haciendo crecer y corregir la clorosis.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar seco y en su envase original.
- No lo transportes y almacenes con alimentos ni animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.

NOTA AL COMPRADOR

El productor/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es apto para el uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier cosa a consecuencia del uso, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

AGITAR ANTES DE USAR DEL PRODUCTO

KLOROFILA

Microelementos de rápida asimilación

COMPOSICIÓN

Nitrato de Magnesio	Mg(NO ₃) ₂	19.70%
Nitrato de Zinc	Zn(NO ₃) ₂	10.10%
Nitrato de Hierro	Fe(NO ₃) ₂	10.60%
Nitrato de Manganese	Mn(NO ₃) ₂	4.30%
Nitrato de Cobre	Cu(NO ₃) ₂	5.20%
Nitrógeno Nítrico	(NO ₃)	13.96%
Mg-Zn-Fe-Mn-Cu	(Quelatados)	5.30%
Auxiliares de Formulación		c.s.p. 1L



Formulado por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830



Distribuido por:
Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

KLOROFILA

Aumenta los pigmentos naturales de las plantas otorgando mayor color a sus cosechas

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Algodón	0.50	1	Iniciar las aplicaciones al inicio de la floración. Realizar 3-4 aplicaciones cada 2-3 semanas.
Frijol, soya, vainita, pallar	0.50	1	Aplicar al inicio de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones a intervalo de 15 a 20 días.
Zapallo, sandia, pepinillo	0.50	1	Aplicar al inicio de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones a intervalo de 15 a 20 días.
Papa	0.50	1	A los 30 - 35 días de la siembra. Hacer 2-3 aplicaciones a intervalo de 15 a 20 días.
Tomate, paprika, ají, pimiento	0.50	1	Aplicar al inicio de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones a intervalo de 15 a 20 días.
Cebolla, ajo, apio, col, brócoli	0.50	1	Iniciar la primera aplicación a los 12-15 días del trasplante. Hacer 2-3 aplicaciones a intervalo de 15 días.
Espárrago, maíz, sorgo, cebada, trigo, alcachofa	0.50	1	Iniciar una vez que esté bien formada la planta, repetir 2-3 aplicaciones cada 15 a 20 días.
Caña de azúcar	0.25	1 - 1.5	A los 20 - 25 días del brotamiento o después de formadas bien las plantas, repetir cada 20 días.
Fresa	0.50	1	Iniciar a la floración, repetir 2-3 aplicaciones cada 20 días.
Cítricos: limón, naranjas, tangelo, mandarina, etc.	0.50	3 - 5	Primera aplicación en brotamiento de primavera. Segunda aplicación en brotamiento de verano. Para corregir deficiencias de microelementos.
Vid, arándano, palto, mango, pecana	0.50	2 - 3	Primera aplicación antes de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones cada 30 días.
Manzano, peral, melocotón	0.50	1	Iniciar después de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones cada 20 días.
Café, cacao, maracuyá	0.50	1	Iniciar después de la floración. Hacer 2-3 aplicaciones cada 20 días.

1.3 cm

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo rojo CAISAC
Pantone 2945 C

Logo semillas
C2 M70 Y96 K0

Logo semillas
C100 M80 Y0 K0

Verde oscuro
Pantone 355 C

Verde Claro
Pantone 373 C