

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

MOYBOR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MOYBOR aporta Molibdeno, nutriente esencial que actúa como co-factor enzimático en las reacciones bioquímicas a nivel celular. Es un componente de las enzimas nitrato y nitrato reductasa que ayuda a las plantas a optimizar el nitrógeno amoniacal (NH₄) para la síntesis de aminoácidos y proteínas. Favorece el transporte de los azúcares hacia los frutos y los órganos de reserva de la planta.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar fresco y en su envase original.
- No lo transporte y almacene con alimentos y animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No es tóxico a los humanos y animales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta etiqueta.

FERTILIZANTE FOLIAR DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición (P/V)

Molibdeno (Mo) 6 %



Formulado y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

RECOMENDACIONES DE USO

Actúa como co-factor enzimático y movilizador de azúcares y carbohidratos hacia los órganos de reserva. Además, incrementa la síntesis de ácido abscísico, favoreciendo el desarrollo del color en los frutos.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Arándano, durazno, granado, mango manzano, pitahaya, vid	0.10-0.25	0.3-1	• Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 cm y repetirlas a intervalos de 15 días durante la etapa vegetativa. • Se recomienda aplicar en palto para controlar el crecimiento de los brotes cuando hay competencia con la floración. • Aplicar a intervalos de 15 días para favorecer el metabolismo del nitrógeno en las plantas. • Aplicar al inicio del envero para favorecer la toma de color y la concentración de azúcares. • Se recomienda alternar aplicaciones foliares, usando la dosis mínima, y aplicaciones vía riego, utilizando la dosis máxima.
Citricos: Mandarina, naranja, limón, toronja	0.10-0.25	0.5-1	
Palto			
Espárrago, cebolla, fresa, pimiento, zanahoria	0.10-0.25	0.3-0.5	
Papa, camote, yuca			
Frejol, pallar			

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

MOYBOR puede aplicarse en los cultivos según las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

MOYBOR es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.