

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

DESCRIPCIÓN

PACKFRUT, es un bionutriente de aplicación foliar en base a Calcio-Boro completado con ácidos orgánicos y carboxílicos, su formulación floable permite mezclas con productos que se aplican en la etapa de pre-floración favorece el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída excesiva.

Los ácidos carboxílicos contenidos en PACKFRUT, aseguran la movilidad del calcio dentro de la planta evitando los desórdenes fisiológicos en los frutos.

El Calcio contenido en PACKFRUT, mejora la fortaleza y elasticidad de los tejidos en los órganos reproductivos, al favorecer la formación de pectatos de calcio en la lámina media de las paredes celulares. Fortifica la estructura del citoplasma celular.

El Boro contenido en PACKFRUT, incentiva el desarrollo del tubo polínico y favorece la producción del polen para mejorar la fecundación de flores y obtener un máximo cuajado y uniformidad de frutos maximiza el porcentaje de calidad exportable.

En los cultivos aplicados con PACKFRUT, los frutos tienen mayor vida post-cosecha.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

PACKFRUT, evita la caída de flores y frutos, mediante la regulación del Etileno, que se produce por las altas temperaturas.

PACKFRUT, facilita el movimiento de azúcares y almidones a los órganos de reserva.

PACKFRUT, regula el exceso de nitrógeno en la planta evitando que esta se "envicie".

PACKFRUT, evita los principales desórdenes fisiológicos en los diferentes cultivos tratados.

PRECAUCIONES

Consérvese en lugar seco y en su envase original.

No lo transporte y almacene con alimentos y animales.

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El formulador y distribuidor garantiza que el producto concuerda con la descripción química y es apto para su uso siguiendo las instrucciones. El titular no acepta responsabilidad por daños que puedan producirse en los cultivos a consecuencia del mal uso del producto.

PACKFRUT®

Calcio y Boro con ácidos Carboxílicos

Su composición y formulación floable sumado a la acción de los ácidos carboxílicos hace de PACKFRUT único en su tipo.

COMPOSICIÓN:

Calcio (CaO).....	15%
Boro(B).....	1.5%
Ácidos Carboxílico	6%
Protohormonas	0.01%

Formulado por:


Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444

Distribuido por:


Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

CUADRO DE USOS Y DOSIFICACIÓN

CULTIVO	Dosis	Momento de Aplicación
Vid (Mesa y vineras)	2-3L/ha	- Inicio floración. - Durante el cuajado y desarrollo de frutos.
Fresa	0.5-1L/ cilindro	- Inicio floración. - Durante el cuajado y desarrollo de frutos.
Espárrago	2-3L/ha	- Inicio floración del primer brotamiento. - Repetir la aplicación 15 días después.
Algodón, Pimiento, Tomate, Aji, Páprika, Quinua	0.5-1L/ cilindro	- Inicio floración. - Al cuajado de frutos.
Papa	0.5-1L/ cilindro	- Inicio de tuberización. - Durante el desarrollo de tubérculos.
Alcachofa	2-3L/ha	- Inicio de floración. - Durante el desarrollo de capítulos.
Cebolla, Ajos	2-3L/ha	- Inicio de floración. - Durante el desarrollo de capítulos.
Frijol, Pallar, vainita, Arveja, Haba, Garbanzo	0.5-1L/ cilindro	- Inicio floración. - Al cuajado de frutos.
Zapallo, Melón, pepinillo, Sandía	0.5-1L/ cilindro	- Inicio floración. - Durante el cuajado y desarrollo de frutos.
Frutales: Palto, Arandanos, Granado Cítricos, Mango, Cacao y Café	2-3L/ha	- Inicio floración. - Durante el cuajado y desarrollo de frutos.
Arroz	0.5-1L/ cilindro	- De 2 - 3 Aplicaciones por campaña.

MODO DE APLICACIÓN: APLICACIONES FOLIARES, puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión convencionalmente usados.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Es recomendable aplicar en las primeras etapas de floración y cuajado de frutos.

FITOTOXICIDAD: No existe problemas de fitotoxicidad cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.