

29.2 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar
Cicotox: 0800-15040
Cisproquim: 0800-50-847
Essalud: 117 (línea gratuita) CAISAC: 255-2830

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROPIXON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Propiconazole..... 250 g/L
Solvesso 150..... 350 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA Nº 779 - SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:



Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED

12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK. China.

Lote Nº:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROPIXON® es un fungicida sistémico, con acción protectante y curativa. Su modo de acción es inhibir la biosíntesis del ergosterol en las membranas celulares del hongo, causando un desarrollo anormal del hongo, para finalmente causarle la muerte.

PROPIXON®, se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y complementar el volumen de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/cil 200 L	L/ha		
ESPÁRRAGO	“Cercosporiasis”	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2	-	30	0.05
FRIJOL	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	0.15 -0.2	-	28	0.05
ARROZ	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	23	0.7
MELOCOTON	“Oidiosis”	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.10-0.125	-	7	5
CAFÉ	“Roya de Café”	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3	0.6	30	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar sólo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

PROPIXON no es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

COMPATIBILIDAD

PROPIXON es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



1.3 cm

Banda Azul Pantone 293 C

Logo caisac
Pantone 711 C

Logo caisac
Pantone 2945 C