

Fecha: 25/05/2026
Ancho 15 cm y largo 21 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

- **Rhuzterr® WP** es un Bioestimulante biológico en base a los hongos *Trichoderma* spp., *Paecilomyces lilacinus* y distintas especies de *Bacillus* spp. La que logra un formulado con amplio beneficio para el cultivo, alta efectividad y rapidez de su acción en el suelo y la planta.

- La formulación de **Rhuzterr® WP** está compuesta por endosporas y conidias, las que son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia.

- **Rhuzterr® WP** presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo. Actúa como inductor de resistencia sistémica adquirida (SAR) otorgando una mayor resistencia contra los patógenos que afectan al sistema radicular.

- Los microorganismos que contiene presentan diversas ventajas como agente de control biológico, pues posee un rápido crecimiento y desarrollo. Aparte de esto produce una gran cantidad de enzimas, inducibles con la presencia de hongos fitopatógenos. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos.

MODO DE ACCION

Rhuzterr® WP es un bioestimulante biológico que actúa como protector radicular y activador biológico de los suelos con microflora benéfica y acción mejoradora de los suelos, capaz de inducir la multiplicación y la actividad microbiana autóctona del suelo por la alta carga microbiana y alto potencial reproductivo sobre un sustrato orgánico, al incorporarlo al suelo sobre el abono orgánico (Estiércol, compost, humus de lombriz, abonos verdes o restos de vegetales trozados) favorece el incremento en forma exponencial de la microflora existente y nueva.

La mayor cantidad de microorganismos en el suelo intensifica la rapidez amonificadora y fermentadora de la materia orgánica.

CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS

Los microorganismos que contiene **Rhuzterr® WP** se encuentran en diversos ambientes, las temperaturas presentes en los agro- ecosistemas, permiten el desarrollo de estos microorganismos en la zona de la rizósfera donde se tiene las condiciones necesaria para iniciar el proceso de colonización, por lo que es necesario una buena aplicación para que los conidios se distribuyan uniformemente.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN.

Rhuzterr® WP, no es tóxico para el hombre, animales o plantas, pero las conidias y esporas que contiene, podrían causar algún tipo de alergia; por esta razón se recomienda:

- Preparar la solución bajo sombra nunca a pleno sol.
- Preparar la solución (usando agua limpia y blanda) y aplicar inmediatamente. No guardar la solución preparada; para realizar la aplicación al día siguiente.
- Usar mascarilla, guantes, y anteojos cuando se realiza la aplicación.
- Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo.
- No fumar o comer durante su aplicación.
- Lavarse y cambiarse la ropa después de la aplicación
- Descartar el producto usado enterrándolo, nunca dejarlo expuesto en el lugar de la aplicación.
- Para realizar la aplicación se debe utilizar equipos que estén limpios; libres de restos de químicos.

PERIODO DE CARENCIA

No se contempla período de carencia para este producto no existiendo así mismo ninguna restricción en el tiempo de reingreso al área tratada. Se recomienda almacenarlo en un lugar seco, fresco, bien ventilado, donde no se encierre el calor y no almacenar por un tiempo mayor de 1 año.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS/APLICACIÓN	MOMENTO DE APLICACIÓN
Frutales: Arándanos, vid, palto, cítricos, granado, olivo, mango, café, cacao, granadilla, etc.	0.5 – 1 kg/ha/aplicación	- Brotamiento en plantones. - Flash de crecimiento de raíces en huertos productivos. - Es necesario tener raíces nuevas y presencia de fuente de materia orgánica en el suelo.
Hortalizas: Capsicum (páprika, pimiento, ají, etc). Espárrago, melón, sandía, fresa, tomate, zanahoria, cebolla, ajos, etc.	Aplicación al suelo vía drench o fertirriego, según condición del cultivo.	- En las primeras etapas de crecimiento del cultivo.



RHUZTERR® WP

BIOESTIMULANTE BIOLOGICO

Polvo Mojable - (WP)

Composición:

Extracto de algas marinas	5 %
Aminoácidos	5 %
Oligosacáridos	5 %
<i>Trichoderma</i> spp.	mínimo 1.6x10 ⁹ ufc/g
<i>Bacillus</i> spp.	mínimo 1.5x10 ¹⁰ ufc/g
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	mínimo 1.6x10 ⁹ ufc/g
Auxiliares de formulación	c.s.p 1 kg

Formulado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCION