

14.5 x 29.2 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aguas para consumo

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

SAMU: 106
CAISAC: 01-255-2830
CICOTOX (01) 328-7700

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido Giberelico..... 40 g/L
Alcohol isopropilico..... 758 g/L

Reg. PBUA N°228 -SENASA

Titular de Registro, Formulator y Distribuidor:



Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Momento de aplicación	Dosis ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días).	125	7	5
ALFALFA	Crecimiento vegetativo.	50	N.A.	5
CEBOLLA	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	25 - 50	15	5
PAPA	Brotamiento del tubérculo.	25	N.A.	5
VID	La aplicación debiera realizarse en: 1° Bayas de 9-12 mm de diámetro. 2° Bayas de 14-16 mm de diámetro. 3° Bayas de 18-20 mm de diámetro.	150	14	5

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de tres aplicaciones por campaña con frecuencia de 15 días entre aplicaciones. Considerar 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RIVAL® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

RIVAL® no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



1.3 cm



1 cm



11 x 23 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aguas para consumo

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
 - Si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

SAMU: 106

CAISAC: 01-255-2830

CICOTOX (01) 328-7700

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido Giberelico..... 40 g/L
Alcohol isopropilico..... 758 g/L

Reg. PBUA N°228 - SENASA

Titular de Registro, Formulator y Distribuidor:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 500ml

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Momento de aplicación	Dosis ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días).	125	7	5
ALFALFA	Crecimiento vegetativo.	50	N.A.	5
CEBOLLA	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el trasplante.	25 - 50	15	5
PAPA	Brotamiento del tubérculo.	25	N.A.	5
VID	La aplicación debiera realizarse en: 1° Bayas de 9-12 mm de diámetro. 2° Bayas de 14-16 mm de diámetro. 3° Bayas de 18-20 mm de diámetro.	150	14	5

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de tres aplicaciones por campaña con frecuencia de 15 días entre aplicaciones. Considerar 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RIVAL® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

RIVAL® no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



1 cm

4.4 cm x 20.5 cm



(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido Giberelico..... 40 g/L

Alcohol isopropilico..... 758 g/L

Reg. PBUA N°228 -SENASA

Titular de Registro,
Formulador y Distribuidor:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av Benavides 1579. Oficina 702. Lima 18-Perú. Telf.: (01) 255-2830

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA

ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Momento de aplicación	Dosis ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60, 75 y 90 días).	125	7	5
ALFALFA	Crecimiento vegetativo	50	N.A.	5
CEBOLLA	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	25 - 50	15	5
PAPA	Brotamiento del tubérculo.	25	N.A.	5
VID	La aplicación debiera realizarse en: 1° Bayas de 9-12 mm de diámetro. 2° Bayas de 14-16 mm de diámetro. 3° Bayas de 18-20 mm de diámetro.	150	14	5

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



1 cm

Altura: 3.51 cm

Ancho : 11.40 cm

RIVAL®

(Acido Giberellico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA
Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido Giberellico..... 40.0 g/L
Alcohol isopropilico 758.0 g/L

Reg. PBUA N°228 -SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú

Contenido Neto: 30ml

PRECAUCIÓN

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE



1 cm

Altura: 3.51 cm
Ancho : 11.40 cm

RIVAL®
(Acido Giberellico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA
Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Acido Giberellico..... 40.0 g/L
Alcohol isopropilico 758.0 g/L

Reg. PBUA N°228 -SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:

 **Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702 .
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú

Contenido Neto: 25ml

PRECAUCIÓN

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con
abundante agua y jabón.

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE



1 cm

