

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

### PRECAUCIONES

- No almacenar ni transportar junto con alimentos ni animales.
- Consérvese en lugar o almacén fresco y su envase original bien cerrado.
- Almacenamiento: No debe almacenarse a menos de 0°C, pues forma cristales.
- No es inflamable.
- Mantener el producto alejado de las personas, animales y de productos alimenticios y medicinales.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia por 15 minutos.
- Lávese las manos y cara con abundante agua y jabón después de las aplicaciones.

### NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El fabricante/ vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse a consecuencia del uso, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

### AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

# SUNSET

## PROTEGE LOS FRUTOS CONTRA QUEMADURAS SOLARES

### COMPOSICIÓN:

Silicatos totales ..... 60.00 %  
Óxido de Zinc (ZnO) ..... 2.00 %  
Agente humectante y Auxiliares de  
formulación. .... c.s.p. 1 L

Formulado y Distribuido por:

 **Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**  
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.  
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 255-2830



Contenido Neto: 1L

### CARACTERÍSTICAS

SUNSET es un protector solar para frutales y cultivos anuales formulado a base de silicatos y Óxido de Zinc, que reducen el daño por estrés térmico y golpe de sol. Está formulación contiene un alto contenido de silicatos especiales de alta capacidad reflectiva características que evitan efectos adversos sobre las plantas sin interferir en el intercambio gaseoso y de agua a nivel estomático.

### INSTRUCCIONES DE USO

Disolver la dosis adecuada de SUNSET en un recipiente con el volumen adecuado de agua (50 - 100 L) hasta obtener una mezcla homogénea, luego verter la mezcla al tanque de aplicación que se encuentra a la mitad de su volumen total activar el agitador y completar con agua hasta el volumen final.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

| CULTIVO                                            | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                  | DOSIS                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                                           | Fruto entre 25 - 40 mm.                                                | 0.5 - 1 %, equivalente<br>1-2 L /200 L.                                                                                 |
| Granado                                            | Fruto con 40 mm.                                                       |                                                                                                                         |
| Manzanas y Peras                                   | Diámetro de frutos de 15 mm y finalizados los tratamientos para raleo. | 5 L/ha en hortalizas y frutales de porte bajo con gasto de agua < a 1000 L/ha.                                          |
| Piña                                               | 20 días antes de iniciación del fruto.                                 |                                                                                                                         |
| Vid                                                | Con tamaño de uva de 10 mm.                                            | 10 L/ha en árboles frutales de porte alto con gasto de agua > a 1000 L/ha.                                              |
| Berenjena                                          | Frutos cuajados.                                                       |                                                                                                                         |
| Pimiento                                           | Frutos cuajados.                                                       |                                                                                                                         |
| Tomate                                             | Frutos cuajados.                                                       | Realizar las aplicaciones necesarias para mantener la protección de los cultivos desde el brotamiento hasta la cosecha. |
| Cucurbitáceas                                      | Durante el desarrollo del fruto hasta la maduración.                   |                                                                                                                         |
| Frutales: arándano, palto, mango, papaya, pitahaya | Fruto con diámetro entre 20-30 mm.                                     |                                                                                                                         |

### FITOTOXICIDAD

No se presenta si se aplica según las recomendaciones de la etiqueta.

### COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

### PRECAUCIONES

- No almacenar ni transportar junto con alimentos ni animales.
- Consérvese en lugar o almacén fresco y su envase original bien cerrado.
- Almacenamiento: No debe almacenarse a menos de 0°C, pues forma cristales.
- No es inflamable.
- Mantener el producto alejado de las personas, animales y de productos alimenticios y medicinales.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia por 15 minutos.
- Lávese las manos y cara con abundante agua y jabón después de las aplicaciones.

### NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El fabricante/ vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse a consecuencia del uso, ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

**AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

# SUNSET

PROTEGE LOS FRUTOS CONTRA  
QUEMADURAS SOLARES

### COMPOSICIÓN:

Silicatos totales ..... 60.00 %  
Óxido de Zinc (ZnO) ..... 2.00 %  
Agente humectante y Auxiliares de  
formulación. .... c.s.p. 1 L

Formulado y Distribuido por:

 **Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**  
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702.  
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 255-2830

Contenido Neto: 1L



### CARACTERÍSTICAS

SUNSET es un protector solar para frutales y cultivos anuales formulado a base de silicatos y Óxido de Zinc, que reducen el daño por estrés térmico y golpe de sol. Está formulación contiene un alto contenido de silicatos especiales de alta capacidad reflectiva características que evitan efectos adversos sobre las plantas sin interferir en el intercambio gaseoso y de agua a nivel estomático.

### INSTRUCCIONES DE USO

Disolver la dosis adecuada de SUNSET en un recipiente con el volumen adecuado de agua (50 - 100 L) hasta obtener una mezcla homogénea, luego verter la mezcla al tanque de aplicación que se encuentra a la mitad de su volumen total activar el agitador y completar con agua hasta el volumen final.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

| CULTIVO                                            | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                  | DOSIS                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                                           | Fruto entre 25 - 40 mm.                                                | 0.5 - 1 %, equivalente<br>1-2 L /200 L.                                                                                 |
| Granado                                            | Fruto con 40 mm.                                                       |                                                                                                                         |
| Manzanas y Peras                                   | Diámetro de frutos de 15 mm y finalizados los tratamientos para raleo. | 5 L/ha en hortalizas y frutales de porte bajo con gasto de agua < a 1000 L/ha.                                          |
| Piña                                               | 20 días antes de iniciación del fruto.                                 |                                                                                                                         |
| Vid                                                | Con tamaño de uva de 10 mm.                                            | 10 L/ha en árboles frutales de porte alto con gasto de agua > a 1000 L/ha.                                              |
| Berenjena                                          | Frutos cuajados.                                                       |                                                                                                                         |
| Pimiento                                           | Frutos cuajados.                                                       |                                                                                                                         |
| Tomate                                             | Frutos cuajados.                                                       | Realizar las aplicaciones necesarias para mantener la protección de los cultivos desde el brotamiento hasta la cosecha. |
| Cucurbitáceas                                      | Durante el desarrollo del fruto hasta la maduración.                   |                                                                                                                         |
| Frutales: arándano, palto, mango, papaya, pitahaya | Fruto con diámetro entre 20-30 mm.                                     |                                                                                                                         |

### FITOTOXICIDAD

No se presenta si se aplica según las recomendaciones de la etiqueta.

### COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.