

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

PRECAUCIONES

- No almacenar ni transportar junto con alimentos ni animales.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No debe almacenarse a menos de 0°C, pues forma cristales.
- No es inflamable.
- Mantener el producto alejado de las personas, animales y de productos alimenticios y medicinales.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia por 15 minutos.
- Lávese las manos y cara con abundante agua y jabón después de las aplicaciones.

NOTA AL COMPRADOR Y/O USUARIO

El fabricante/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción indicada y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse a consecuencia del uso ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

SUNSET® NT

PROTEGE LOS FRUTOS CONTRA QUEMADURAS SOLARES

COMPOSICIÓN:

Silicatos totales..... 25.00 %
Carbonato de calcio..... 35.00 %
Óxido de Zinc (ZnO)1.00 %
Agentes humectantes y
auxiliares de formulación.....c.s.p. 1 L

Formulado y Distribuido por:

 **Comercial Andina
Industrial S.A.C.**
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 255-2830

Contenido Neto: 1L



CARACTERÍSTICAS

SUNSET® NT es un protector solar para frutales y cultivos anuales formulado a base de silicatos, carbonato de calcio y óxido de zinc que reduce el daño por estrés térmico y golpes de sol. Esta formulación contiene silicatos especiales de alta capacidad reflectiva que sumado al carbonato de calcio y al óxido de zinc proporciona una excelente protección contra las quemaduras solares sobre las plantas sin interferir en el intercambio gaseoso y la del agua a nivel estomático.

INSTRUCCIONES DE USO

Disolver la dosis adecuada de **SUNSET® NT** en un recipiente con el volumen adecuado de agua (50 - 100 L) hasta obtener una mezcla homogénea, luego verter la mezcla al tanque de aplicación que se encuentra a la mitad de su volumen total, activar el agitador y completar con agua hasta el volumen final.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
Cítricos	Fruto entre 25 - 40 mm.	0.5 - 1 %, equivalente 1-2 L /200 L.
Granado	Fruto con 40 mm.	
Manzanas y peras	Diámetro de frutos de 15 mm y finalizados los tratamientos para raleo.	5 L/ha en hortalizas y frutales de porte bajo con gasto de agua < a 1000 L/ha.
Piña	20 días antes de iniciación del fruto.	
Vid	Con tamaño de uva de 10 mm.	10 L/ha en árboles frutales de porte alto con gasto de agua > a 1000 L/ha.
Berenjena	Frutos cuajados.	
Pimiento	Frutos cuajados.	
Tomate	Frutos cuajados.	Realizar las aplicaciones necesarias para mantener la protección de los cultivos desde el brotamiento hasta la cosecha.
Cucurbitáceas	Durante el desarrollo del fruto hasta la maduración.	
Frutales: arándano, palto, mango, papaya, pitahaya	Fruto con diámetro entre 20-30 mm.	

FITOTOXICIDAD

No se presenta si se aplica según las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.