

TROFEO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA- WG

COMPOSICIÓN:

Fipronil.....	400 g/kg
Imidacloprid.....	400 g/kg
Aditivos.....	c.s.p 1 kg

PQUA N° 1574- SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED

Room 1510, Nro. 500, Xinjiang Road, Shanghai.
China. Telf.: + 86 – 21- 63807578

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

12 x 16.5 cm

TROFEO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA- WG

COMPOSICIÓN:

Fipronil..... 400 g/kg
Imidacloprid..... 400 g/kg
Aditivos..... c.s.p 1 kg

PQUA N° 1574- SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:

**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Room 1510, Nro. 500, Xinjiang Road, Shanghai.
China. Telf.: + 86 - 21- 63807578

Contenido Neto: 100g

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o la espersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de las aplicaciones.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD EN LINEA: 411 - 8000, opción 4

CAISAC: 255-2830

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/200 L		
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0,40*	-	14	0,02** 0,1***
Espárrago	"Caracha" (mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,200	21	0,005** 0,05***
Arroz	"Mosca minadora"	<i>Hydrellia wirthi</i>	0,1*	-	21	0,01** 1,5***
Pimiento	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,100	21	0,005** 1***
Tomate	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,150	7	0,005** 0,5***

PC: Período de carencia

*Para un volumen de agua de 400 L/ha

LMR: Límite máximo de residuos

Fipronil *Imidacloprid



LMR: Límite máximo de residuos
****Fipronil ***Imidacloprid**

20.5 cm x 27.5 cm

TROFEO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA- WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil..... 400 g/kg
Imidacloprid..... 400 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

PQUA N° 1574- SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:
**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Room 1510, Nro. 500, Xinjiang Road, Shanghai.
China. Telf.: + 86 – 21- 63807578

Contenido Neto: 500g

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO YAPLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de las aplicaciones.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazoles y neonicotinoides

- En caso de ingestión, enjuagar la boca. Busque atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada de inmediato, lavar la piel con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con un médico.
- En caso inhalación, retirar a la persona al aire libre, buscar asistencia medica si las circunstancias lo ameritan.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD EN LINEA: 411 – 8000, opción 4
CAISAC: 255-2830

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase cortándolo y deposítelo en sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/200 L		
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0,40*	-	14	0,02** 0,1***
Espárrago	“Caracha” (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0,200	21	0,005** 0,05***
Arroz	“Mosca minadora”	<i>Hydrellia wirthi</i>	0,1*	-	21	0,01** 1,5***
Pimiento	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)”	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0,100	21	0,005** 1***
Tomate	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0,150	7	0.005** 0.5***

PC: Periodo de carencia
*Para un volumen de agua de 400 L/ha

LMR: Límite máximo de residuos
Fipronil *Imidacloprid



14.5 cm x 18.5 cm

TROFEO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA- WG

COMPOSICIÓN:

Fipronil..... 400 g/kg
Imidacloprid..... 400 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

PQUA N° 1574- SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II,
Lima 18 - Perú. Telf.: (011) 255-2830

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Room 1510, Nro. 500, Xinjiang Road, Shanghai,
China. Telf.: + 86 – 21- 63807578

Contenido Neto: 250g

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de las aplicaciones.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD EN LINEA: 411 – 8000, opción 4
CAISAC: 255-2830

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	kg/200 L		
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0,40*	-	14	0,02** 0,1***
Espárrago	“Caracha” (mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,200	21	0,005** 0,05***
Arroz	“Mosca minadora”	<i>Hydrellia wirthi</i>	0,1*	-	21	0,01** 1,5***
Pimiento	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,100	21	0,005** 1***
Tomate	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	-	0,150	7	0,005** 0,5***

PC: Periodo de carencia
*Para un volumen de agua de 400 L/ha

LMR: Limite máximo de residuos
Fipronil *Imidacloprid

