Frutyflor-PK®

Fecha de actualización: 14-10-2026	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: FRUTYFLOR-PK 1-26-45
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase : Fertilizante foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Nitrógeno Total(N) ..... 1.0 %
Fósforo Disponible (P_2O_5) ..... 26.0 %
Potasio Soluble (K_2O) ..... 45.0 %
Magnesio (MgO) ..... 400 ppm
Hierro (Fe_2O_3) ..... 100 ppm
Zinc (Zn) ..... 100 ppm
Manganeso (Mn) ..... 100 ppm
Cobre (Cu) ..... 100 ppm
Boro (B) ..... 85 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico	Líquido
Color	Azul
Olor	Característico
pH	7.5 ± 1.0
Densidad (g/mL) a 20 °C	1.35 ± 0.05
Solubilidad en agua	Soluble
Inflamabilidad	No inflamable
Explosividad	No explosivo
Corrosividad	No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE - (SL)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **FRUTYFLOR-PK®** es un fertilizante foliar líquido concentrado con un alto contenido en Fósforo (P) y Potasio (k), más microelementos

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **FRUTYFLOR-PK®** induce y estimula la multiplicación de los órganos florales y fruteros; asegurando un cuajado y desarrollo final de los frutos. Los microelementos proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		ÉPOCA Y N° DE APLICACIONES
	L/ha	L/ 200L	
Papa	2	1	1° Al inicio de floración antes del aporque, en mezcla con Big-Hor. 2° A los 25 días de la anterior aplicación para mejor tuberización en mezcla con Nitrosol-N.
Algodón	2	1	1° Al inicio de la formación del botón floral, en mezcla con Keltex Calcio-Boro y Big-Hor. 2° A la formación de bellotitas en mezcla con Big-Hor.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	2	1	1° Al inicio de la floración para inducir mayor número de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera, una vez cuajado los frutos. En ambas aplicaciones con Big-Hor, para evitar caída de flores y frutos. Un mes antes de la cosecha.
Fríjol, Vainita, Arveja, Pallar, Garbanzo	2	1	1° A la floración para inducir a la multiplicación de flores. 2° A los 15 a 20 días de la primera. En mezcla con Big-Hor.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	2	1	1° Al inicio de la floración para la multiplicación de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera. En ambos conviene en mezcla con Big-Hor, para evitar la caída de flores y frutos, respectivamente.
Arroz, Apio, Poro, Nabo, Ajo, Col, Cebolla, Coliflor, Zanahoria	2	1	1° A los 25 a 30 días de siembra o transplante. 2° De 20 a 25 días de la primera aplicación. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor.
Frutales: Arándano, Cítricos, Palto Melocotón, Manzano, Peral, Mango, vid	3-5	1	1° Al inicio de la floración. 2° Al cuajado de los frutos. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor para evitar caída de flores y frutos.
Marigold, Rosas	2	1	1° Al inicio de la formación de flores, mezclada con Big-Hor. 2° Después de cada cosecha, para mejorar la floración siguiente.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **FRUTYFLOR-PK®** se recomienda aplicarlo en un primer momento antes del inicio de la floración y una segunda aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.