# LESSICK 72 WP ®

| *Fecha de actualización: 07-10-2026* | *Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización* |
|---|---|

## I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

**Producto:** LESSICK 72 WP

**No Registro:** PQUA N° 472 -SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor**: Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso**: FUNGICIDA AGRICOLA

## II. INGREDIENTES ACTIVOS

Cymoxanil 80g/kg + Mancozeb 640 g/kg

## III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido
- Color: Azul a azul verdoso
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 7.0 ± 1.0 (1% en solución)
- Inflamabilidad: Inflamable
- Explosividad: Explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

## IV. FORMULACION

Polvo Mojable – WP

## V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LESSICK® 72 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protectivo y curativo a la planta.

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

MECANISMO DE ACCIÓN: Por la mezcla de sus dos ingredientes activos este fungicida actúa de forma preventiva y curativa. Mancozeb es un fungicida multisitio alterando el metabolismo celular en diversos puntos. Cymoxanil actúa inhibiendo diversos procesos como la síntesis de ácidos nucleicos, respiración, inhibición de aminoácidos y permeabilidad de la membrana.

MODO DE ACCIÓN: el Mancozeb actúa por contacto, mientras que el Cymoxanil tiene ligera actividad translaminar expandiéndose por toda la hoja tratada.

## VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTÍFICO | Kg/200 L | Kg/ha | | |
| Cebolla | Mildiu | *Peronospora destructor* | 0.5 | - | 21 | 0.05 Cymoxanil<br>1 Mancozeb |
| Papa | Rancha | *Phytophthora infestans* | 0.5 | 1-2 | 14 | 0.05 Cymoxanil<br>0.3 Mancozeb |
| Pimiento | Rancha o hielo azul | *Phytophthora capsici* | 0.5-0.75 | 1-1.5 | 14 | 0.05 Cymoxanil<br>2 Mancozeb |
| Vid | Mildiu | *Plasmopara viticola* | 0.5 | 2 | 28 | 0.3 Cymoxanil<br>1.5 Mancozeb |

**P.C.:** Período de Carencia **LMR:** Límite de Máximo de Residuos

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad en el cultivo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente Peligroso – Cuidado

## X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos,

acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.