MIKROFLOW Mn25 Zn35

Fecha de actualización: 27-08-2026	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: MIKROFLOW Mn25-Zn35
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase: Fertilizante foliar de uso agrícola

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Manganeso (Mn) ..... 25.0 %
Zinc (Zn) ..... 35.0 %
Auxiliares de formulación c.s.p.1L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico:	líquido
Color:	beige
Olor.	característico
Densidad:	1.75 ± 0.1 g/ml
pH:	10 ± 1.0
Inflamabilidad	no inflamable
Explosividad	no explosivo
Corrosividad	no corrosivo

Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACIÓN

SUSPENSION CONCENTRADA - (SC)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **MIKROFLOW Mn25-Zn35** es un fertilizante floable para aplicación foliar, es un corrector de deficiencias de Manganeso y Zinc de rápida eficacia por contener una alta concentración de ambos nutrientes, especialmente desarrollado para aplicaciones de alto y bajo volumen de mojamiento en los diferentes cultivos.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **MIKROFLOW Mn25-Zn35** mejora el proceso de la fotosintesis en los cultivos y evita la clorosis por deficiencia de Manganeso y Zinc en los cultivos tratados.

- **MIKROFLOW Mn25-Zn35** es absorbido por las hojas de los cultivos para ser traslocado hacia los tejidos en desarrollo y de ese modo corregir las carencias nutricionales en estos elementos, dando como resultado una mayor capacidad fotosintética.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/ha	L/200L	
Vid (Mesa y viníferas)	1.0 - 1.5	-	Brotamiento. Durante el desarrollo de bayas.
Fresa	-	0.25 - 0.5	Antes de Inicio de floración. Durante el desarrollo de frutos.
Espárrago	0.5 - 1.0	-	Desarrollo del primer brotamiento. Repetir la aplicación 15 días después
Algodón, pimiento, tomate, ají, páprika, quinua.	-	0.25 - 0.5	Crecimiento vegetativo. Después del cuajado
Papa	-	0.25 - 0.5	Inicio de tuberización. Durante el desarrollo de tubérculos
Alcachofa	0.5 - 1.0	-	Antes de floración. Durante el desarrollo de capítulos.
Cebolla, ajos, zanahoria.	0.5 - 1.0	-	Inicio de bulbo. Durante el desarrollo de bulbos.
Frijol, pallar, vainita, arveja, haba, garbanzo.	-	0.25 - 0.5	Antes de la floración. Después del cuajado.
Zapallo, melón, pepinillo, sandía.	-	0.25 - 0.5	Antes de la floración. Durante el cuajado y desarrollo de frutos.
Frutales, palto, arándano, granado, cítricos, limón Tahití, mango, cacao, café.	1.0 - 1.5	-	Desarrollo del brote. Desarrollo de frutos.
Arroz	-	0.25 - 0.5	Macollamiento.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Se debe realizar siempre análisis foliar o de suelo antes de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la aplicación.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.