# MOSTRO INSECTICIDA 50 SG

| *Fecha de actualización: 01-08-2026* | *Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización* |
|---|---|

## I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

**Producto:** MOSTRO INSECTICIDA 50 SG

**No Registro:** PQUA N° 1761-SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor**: Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso**: INSECTICIDA AGRICOLA

## II. INGREDIENTES ACTIVOS

Emamectin Benzoate……50 g/kg

## III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado físico: Solido
- Color: Blanco a crema
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 7.5 ± 1.5 (1% en solución)
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

## IV. FORMULACION

Gránulos Solubles (SG)

## V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**MOSTRO INSECTICIDA 50 SG** es efectivo contra larvas de lepidópteros, posee una composición química y un modo de acción distinto a otros insecticidas, razón por la cual no presenta resistencia cruzada con otros productos (organofosforados y piretroides).

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

El Emamectin Benzoate ingrediente activo de **MOSTRO INSECTICIDA 50 SG**, presenta acción por ingestión y alguna actividad de contacto. Con una poderosa actividad translaminar. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Este se paraliza, no se alimenta y no ovipone, y dentro de un corto tiempo muere.

**MOSTRO INSECTICIDA 50 SG** penetra en el tejido de la planta, proporcionando una prolongada actividad de protección sobre la plaga.

## VII. USOS REGISTRADOS

| CULTIVO | PLAGA | | Dosis | P.C (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | Kg/ha | | |
| Paprika | Gusano perforador | *Heliothis virescens* | 0.175 | 7 | 0.02 |
| Espárrago | Gusano perforador | *Heliothis virescens* | 0.3 | 7 | 0.01 |
| Arroz | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.10 - 0.15 | 7 | 0.01 |
| Maíz | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.175 - 0.2 | 7 | 0.01 |
| Palto | Gusano medidor | *Sabulodes aegrotata* | 0.40 - 0.45 | 5 | 0.01 |
| Vid | Gusano ejército | *Spodoptera eridania* | 0.5 | 5 | 0.03 |

**P.C: Periodo de carencia en días.** **L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm**

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

**MOSTRO Insecticida 50 SG**, se aplicará 1 vez por campaña al año. Paprika: cuando aparezcan larvas en el periodo de fructificación. Espárrago y Maíz: aplicar en crecimiento vegetativo. Palto: En crecimiento vegetativo, en los primeros estadios larvales. Utilizar la menor dosis cuando el grado de infestación sea bajo y la mayor dosis cuando el grado de infestación sea alto.

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría II – Moderadamente Peligroso – Dañino

## X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.