Plentyphos-P

Fecha de actualización: 02-11--2026	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: PLENTYPHOS – P
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase : Fertilizante Foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Nitrogeno Total (N) 10.0%
Fósforo disponible (P_2O_5) 45.0%
Potasio soluble (K_2O) 10.0%
Magnesio (MgO) ..... 400 ppm
Hierro (Fe_2O_3) ..... 100 ppm
Zinc (Zn) ..... 100 ppm
Manganeso (Mn) ..... 100 ppm
Cobre (Cu) ..... 100 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Rojo
Olor:	Característico
Densidad:	1.30 ± 0.05 g/ml
pH:	1.8 ± 1.0
Solubilidad en agua:	100 % soluble
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	corrosivo
Estabilidad de almacenamiento:	Estable 3 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE - (SL)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **PLENTYPHOS-P**, contiene un alto porcentaje de Fósforo, en combinación equilibrada con Nitrógeno, Potasio, Microelementos Quelatizados de Mg, Zn, Fe, Cu, Mn y Precursores Hormonales.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **PLENTIPHOS-P** es un fertilizante foliar líquido concentrado, que por su alto contenido de Fósforo (P2O5), en combinación equilibrada con los demás elementos de su composición y precursores hormonales estimula la formación de raíces al inicio de los cultivos, y en su fase final acelera la maduración y crecimiento mejorando calidad y tamaño, acelera la formación de brotes, recupera plantas con problemas elevando sus rendimientos

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
	L /200 L	L/ha	
Papa, arroz, maíz	1 - 2	-	Realizar la aplicación de 10 a 15 días después de la emergencia o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento.
Algodón	1 - 2	-	1° aplicación: Después del desahije. 2° aplicación: Inicios de la floración
Arándano	0.5	2	1° aplicación: Durante el desarrollo del brote. 2° aplicación: Al inicio de la floración.
Tomate, Ají Pimiento, Páprika, Espárrago, Alcachofa	1	-	1° aplicación: A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración.
Frijol, Vainita Arveja, Pallar Garbanzo	1	-	1° aplicación: A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración.
Zapallo, Sandia Pepinillo, Melón, Zapallito italiano	1	-	1° aplicación: A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración.
Coliflor, Brócoli, Col, Apio, Poro, Nabo Ajo, Cebolla, Lechuga	1	-	1° aplicación: A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración.
Cítricos, Manzano, Melocotón, Peral, Fresas, Mango, Palto, Pitahaya	1	-	1° aplicación: Durante el desarrollo vegetativo del cultivo en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración. 3° aplicación: Durante el cuajado de frutos.
Rosas	1	-	1° aplicación: A los 10 a 15 días de la siembra o trasplante, en mezcla con Root-Hor para potenciar el enraizamiento. 2° aplicación: Pre-floración.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **PLENTYPHOS-P** se recomienda aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.