Sanix Cu

FITO-CICATRIZANTE CON ACCIÓN HORMONAL Y CÚPRICO

Fecha de actualización: 06-10-2026	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: SANIX Cu
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase: Cicatrizante Hormonal

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Sulfato de Cobre pentahidratado..... 50.00 g/kg
Betaina .....28.00 g/kg
Sulfato de Zinc.....7.00 g/kg
Propanol. .....100.00 g/kg
Acido alfa naftalenacetico.....3000 ppm
Extracto de algas.....20.00 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

Estado Físico:	Líquido Pastoso
Color:	Verde
Olor:	Característico
pH:	5.0 ± 1.0
Densidad a 20 °C:	1.30 ± 0.05 g/ml
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 2 años

IV. FORMULACIÓN

PASTA – (PA)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **SANIX Cu** es una pasta protectora que se utiliza para evitar el ingreso de patógenos a los cortes de poda y heridas que afectan a los frutales como la vid, palto, arándanos, cítricos, etc. **SANIX Cu** ha sido formulado como una pasta para ser aplicado directamente sobre los cortes de poda recién efectuados evitando así la entrada de hongos que afectan a la madera.
- Condición de Almacenamiento: Conservar bajo techo en un ambiente con temperatura controlada entre 20°C y 25°C.
- Envase: Mantener el envase sellado herméticamente para garantizar la integridad del producto.
- Advertencia: El contacto con el aire causa el secado/endurecimiento irreversible. Por lo tanto, el producto es de uso exclusivo inmediato.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **SANIX Cu**, es una pasta que genera una intensa regeneración celular sobre el punto de corte, además de proteger como una barrera mecánica las heridas causadas por las podas en los árboles frutales, así como heridas en material de propagación como son las estacas, injertos etc.
- Aplicado el producto SANIX **Cu** sobre las heridas forma una barrera protectora que impide el ingreso de microorganismos causantes de necrosis o pudriciones, que dañan los tejidos, impidiendo un normal desarrollo de las plantas

VII. RECOMENDACIONES DE USO

- **SANIX Cu**, es usado sobre las heridas luego de las podas e injertos en árboles frutales y ornamentales para favorecer la cicatrización de la herida e impedir el ingreso de hongos y bacterias causantes de pudriciones y cancros.

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS REFERENCIAL (kg/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Vid, palto, mango, manzano, cítricos, rosas, cacao, peral, granada, cerezo, melocotón, olivo.	Hongos de la madera	*Lasiodiplodia theobromae*	4.0 kg Pintando directamente sobre el corte de poda en los frutales.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Para lograr excelentes resultados se recomienda aplicar la pasta FITO- CICATRIZANTE **SANIX Cu**. En forma directa sobre la herida ocasionada luego del corte y/o poda, mediante una brocha, se recomienda no efectuar riegos antes o inmediatamente después de aplicar SANIX Cu. Para evitar exudados excesivos sobre el punto de corte para la aplicación de la pasta.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.